

**INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

	<b>Por sobre (10 ml)</b>	<b>Por 100 ml</b>
Valor energético (kJ) / (kcal)	173,87 / 42,04	1738,7 / 420,4
Grasas (g)	4,01	40,1
de las cuales: saturadas (g)	0,5	5,0
monoinsaturadas (g)	2,61	26,1
poliinsaturadas (g)	0,91	9,1
Ácidos grasos Omega-3: Docosahexaenoico (22:6ω3, DHA) (g)	0,5	5,0
Eicosapentaenoico (20:5ω3, EPA) (g)	0,06	0,6
Docosapentaenoico (22:5ω3, DPA) (g)	0,04	0,4
Hidratos de carbono (g)	1,67	16,7
de los cuales: azúcares (fructosa) (g)	1,0	10
polialcoholes (g)	0,56	5,6
almidones (g)	0,11	1,1
Fibra alimentaria (g)	0,02	0,24
Proteínas (g)	0	0
Sal / sodio (g)	0	0
Vitaminas y minerales (g)	0	0,12
Potasio (g)	0	0

**INGREDIENTES:** Agua, aceite de oliva, fructosa, **aceite de pescado** concentrado en ácidos grasos Omega-3, humectante (glicerina), emulgente (almidón modificado), aroma (naranja, aceite de romero), espesante (goma xantana), corrector de acidez (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles) y conservadores (sorbito de potasio, benzoato de sodio). **Sin gluten ni lácteos.**

**APARIENCIA:** Emulsión de color crema a amarillo pastel.

**INDICACIONES:** Para el manejo dietético de aquellas situaciones en las que se precise un módulo de DHA (Tridocosahexanoína-AOX®) o un enriquecimiento de la dieta con este triglicérido, como en las Ambliopías con un componente de déficit de DHA de causa nutricional o por toxicidad al alcohol, Trastornos de la Atención, con y sin Hiperactividad, pacientes oncológicos, con Fibrosis Quística, Malabsorción Lipídica y Trastornos del Metabolismo.

**MODO DE EMPLEO:** No necesita preparación. Agitar antes de usar. Abrir el sobre y administrar por vía oral. Tomar preferentemente con las comidas, solo o mezclado con otros alimentos.

**CONSERVACIÓN:** Una vez abierto el sobre consumir inmediatamente. Guardar al abrigo de la luz.

**ADVERTENCIAS:** Producto destinado a niños de más de 3 años. Este producto debe utilizarse bajo supervisión médica. No debe usarse como única fuente de alimento. En los tratamientos con fármacos pro o anticoagulantes, debe tenerse en cuenta la acción anticoagulante de los ácidos grasos Omega 3 de cadena muy larga cuando se administran en cantidades elevadas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Envasado en atmósfera protectora. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el sobre.

Fecha última revisión: Febrero 2024

**BRUDY DHA GEL KIDS. Food for Special Medical Purposes. Very Long-Chain Omega-3 Triglyceride Module (DHA).** 30 sachets of 10.4g. 312 g

**ENGLISH**

**NUTRITIONAL INFORMATION**

	<b>Per serving (10 ml)</b>	<b>Per 100 ml</b>
Energy Value (kJ) / (kcal)	173.87 / 42.04	1738.7 / 420.4
Fats (g)	4.01	40.1
of which: Saturated (g)	0.5	5.0
Monounsaturated (g)	2.61	26.1
Polyunsaturated (g)	0.91	9.1
Omega-3 Fatty Acids: Docosahexaenoic (22:6ω3, DHA) (g)	0.5	5.0
Eicosapentaenoic (20:5ω3, EPA) (g)	0.06	0.6
Docosapentaenoic (22:5ω3, DPA) (g)	0.04	0.4
Carbohydrates (g)	1.67	16.7
of which: Sugars (fructose) (g)	1.0	10
Polyols (g)	0.56	5.6
Starch (g)	0.11	1.1
Dietary Fiber (g)	0.02	0.24
Proteins (g)	0	0
Sal / Sodium (g)	0	0
Vitamins and Minerals (g)	0	0.12
Potassium (g)	0	0

**INGREDIENTS:** Water, olive oil, fructose, concentrated **fish oil** in Omega-3 fatty acids, humectant (glycerin), emulsifier (modified starch), flavor (orange, rosemary oil), thickener (xanthan gum), acidity regulator (citric acid), antioxidants (tocopherol-rich extract), and preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate). **Gluten and lactose-free.**

**APPEARANCE:** Emulsion, cream to pale yellow.

**INDICATIONS:** For the dietary management of situations requiring a DHA module (Tridocosahexanoína-AOX®) or dietary enrichment with this triglyceride, such as amblyopia with a DHA deficiency of nutritional or alcohol toxicity origin, attention disorders, with or without hyperactivity, oncology patients, cystic fibrosis, lipid malabsorption, and metabolic disorders.

**USAGE:** No preparation is needed. Shake before use. Open the sachet and administer it orally. Preferably take with meals, alone, or mixed with other foods.

**STORAGE:** Consume immediately after opening the sachet. Store away from light.

**WARNINGS:** Intended for children over 3 years old. This product should be used under medical supervision. Not to be used as the sole source of nutrition. In treatments with pro or anticoagulant drugs, consider the anticoagulant action of very long-chain Omega-3 fatty acids when administered in high amounts. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Packaged in a protective atmosphere. Consume preferably before the date indicated on the sachet.

Last Revision Date: February 2024

**BRUDY DHA GEL KIDS. Alimento para Fins Medicinais Específicos.** Módulo de Triglicéridos Ómega-3 de cadeia muito longa (DHA). 30 saquetas de 10,4 g. 312 g

**PORTUGUÊS**

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

	<b>Por saqueta (10 ml)</b>	<b>Por 100 ml</b>
Valor energético (kJ) / (kcal)	173,87 / 42,04	1738,7 / 420,4
Lípidos (g)	4,01	40,1
dos quais: saturados (g)	0,5	5,0
monoinsaturados (g)	2,61	26,1
poli-insaturados (g)	0,91	9,1
Ácidos gordos Ómega-3: Docosa-hexaenoíco (22:6ω3, DHA) (g)	0,5	5,0
Eicosapentaenoíco (20:5ω3, EPA) (g)	0,06	0,6
Docosapentaenoíco (22:5ω3, DPA) (g)	0,04	0,4
Hidratos de carbono (g)	1,67	16,7
dos quais: açúcares (frutose) (g)	1,0	10
polióis (g)	0,56	5,6
amídios (g)	0,11	1,1
Fibra alimentar (g)	0,02	0,24
Proteínas (g)	0	0
Sal / sódio (g)	0	0
Vitaminas e minerais (g)	0	0,12
Potássio (g)	0	0

**INGREDIENTES:** Água, azeite de oliva, frutose, **óleo de peixe** concentrado em ácidos gordos Ómega-3, humidificante (glicerina), emulsionante (amido modificado), aroma (laranja, óleo de rosmaninho), espessante (goma xantana), regulador de acidez (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico em tocoferóis) e conservantes (sorbato de potássio, benzoato de sódio). **Isento de gluten.**

**Sem lactose.**

**APARÊNCIA:** Emulsão de cor creme a amarelo pastel.

**INDICAÇÕES:** Para a gestão nutricional de situações em que é necessário um módulo de DHA (Tridocosahexanoína-AOX®) ou um enriquecimento da dieta com este triglicérido, como nas ambliopias com um componente de défice de DHA de causa nutricional ou por toxicidade ao álcool, distúrbios de atenção, com e sem hiperatividade, doentes oncológicos, com fibrose quística, má absorção de lípidos e distúrbios metabólicos.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:** Não precisa de preparação. Agite antes de usar. Abrir a saqueta e administrar por via oral. Tomar de preferência com as refeições sozinho ou misturado com outros alimentos.

**CONSERVAÇÃO:** Depois de aberta a saqueta, consumir imediatamente. Guardar ao abrigo da luz.

**ADVERTÊNCIAS:** Produto destinado a crianças com mais de 3 anos. Este produto deve ser usado sob supervisão médica. Não deve ser usado como única fonte alimentar. Nos tratamentos com fármacos pró ou anticoagulantes, deve ter-se em conta a ação anticoagulante dos ácidos gordos Ómega-3 de cadeia muito longa quando administrados em grandes quantidades. **MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Acondicionado em atmosfera protetora. Consumir de preferência antes da data indicada na saqueta.

Data da última revisão: Fevereiro 2024



B R U D Y L A B ®